

南臺科技大學


校園愛滋防治


與性別友善環境

教師講座



社團法人台灣愛之希望協會

 報告人

 阿丹



講師介紹－鍾安峻

學歷：

國立高雄師範大學性別教育研究所
國立屏東大學心理諮商研究所

經歷：

社團法人台灣愛之希望協會副秘書長（現職）
嘉南藥理大學社會工作系兼任講師（現職）



01

性是什麼？

你是如何看待它？







每次做愛時會淫叫
時，感覺怎樣？

精液可以養顏美容嗎？

燥叫會隨著年齡增長而變大嗎？

處女膜破掉會流很多嗎？

女生高潮時會流很多淫水嗎？

為什麼女生乳頭會勃起？

性愛疼？！

被內射中出來嗎？

處女膜是什麼？

會噴淫水？

可以中出女生嗎？

尻槍尾太多常會變小嗎？

精液吃起來怎樣？

為什麼A片不能看？

打手槍會長不高嗎？

為什麼16歲↓不能發生性行為？

為什麼做愛時會有一種聲音呢？

會得性病嗎？

看到那女的做...
道怎麼解?
雞上?

為什麼做愛時會淫叫
6. 女生肌肉時, 感覺怎樣?

交會時...
交會會傷病?

7. 是肛交還是...
被內射中出...
女生高潮...

被內射中出...
女生高潮...
會噴...
淫...

8. 第一次發生關係

處女膜是什麼?
可以中出女生嗎

會噴...
淫...

時, 女生處女膜破

精液吃起來怎樣

尾...
多...

交會痛嗎?

的時候流血的話,

打手槍會長不高嗎?

那男生在做...

時, 沒帶保險套會

生病嗎?

為什麼做愛時會

打手槍對身體是好是壞?

4. 我看到我媽在... 不知道怎麼辦?

為什麼美國的女生要在口交... 打手槍被媽媽發現時怎麼辦?

怎麼回事?

生的感覺如何?

口交什麼ful

女生爽

為什麼性侵害防治法? 龜頭沒跑出來可以做愛嗎?

口交會痛嗎?

8. 第一... 時, 女生... 的時候... 那男... 時,

事前做愛?

女生在做的時候如果會爽 (那好強跟容易)

有G點這東西嗎?

而...時可以因第二次嗎?

雞巴是叫

1. 打太多會痛是為什麼? 打手槍對

可以用塑膠比當保險套嗎?

2. 做親密互動時女生的感覺如

3. 做愛是男生爽還是女生爽

↑內射說點會射液嗎?

龜頭

女生在

請將手機開機
或
調成震動模式
謝謝合作

請
不要留垃圾在抽屜
請不要留垃圾在抽屜



校園問卷

性經驗

6% 男生居

然國小就有性經驗

5% 第一次

性經驗在國中階段

17% 則

在高中生時期



新聞哇哇哇

後續效應



63%

男大生

51%

女大生



校園問卷

性經驗


只有 **20%** 的民眾全
程戴保險套，在不清楚另一半是否感
染愛滋，恐暴露於風險中。

初次親密關係研究

性經驗

初嘗禁果時沒有使用任何避孕措施 (%)

■ 台灣 ■ 法國 ■ 英國 ■ 美國




資料來源：初嘗禁果沒避孕 台超越歐美 (中央社，2011/09/25)

台灣城鄉差距

校園問卷

城鄉差距

各縣市的未成年生育率差距極大，花蓮縣高達12‰，為全台之冠



資料來源：內政部



性自主權-以 16歲為界

- 1、滿16歲男女有性自主權，可自己決定是否要與他人發生性行為。
2. 若對未滿16歲之人為性行為則涉及刑法第227條對未成年人為性交猥褻罪。

*刑法第227條 (對未成年人為性交猥褻罪)

對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。

對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑。

對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為者，處3年以下有期徒刑。

2、未滿18歲之人對未滿16歲之男女性交或猥褻，為告訴乃論罪，且減輕或免除其刑。

你的愛情步驟



A

1. 留line

4. 談天

2. 牽手

3. 擁抱

5. 性行為

B

4. 談天

1. 留line

2. 牽手

3. 擁抱

5. 性行為

C

5. 性行為

3. 擁抱

4. 談天

2. 牽手

1. 留line

同學的愛情

數位原生代

我昨天去麥當勞和小美混了2小時
爽~有touch到嗎~

靠在一起一下下

爽! 有碰手吧!

載不動許多愁。

春尚好，也擬泛輕舟。只恐雙

人非事事休，欲語淚先流。

風住塵香花已盡，日晚倦

相思!
而立 一個月22天就拿了



科技改變性接觸的機會

世界正在改變





科技改變性接觸的機會

1980年代以後為3C 原生代

Evolution of the Mobile Phone



科技改變性接觸的機會

數位原生代

數位原生代的特質(1980年代以後出生)

喜歡

- 同時處理許多事情
- 愛看電視、更愛網路，喜歡視覺和影音
- 傳簡訊、觸控螢幕、儲存大量音樂
- 即時互動、立即回饋
- 喜歡展現自我、自訂步調、有彈性
- 生活在虛擬與現實之間



不喜歡

- 單機版遊戲
- 任何「有線」和電池壽命低於10小時的裝置
- 制式、沒有變化；統一規範、一視同仁
- 文字及靜態聽講和延遲回饋。





網路交友







Opinions
評論



002 兒少性剝削-- 電動

南韓性剝削案首腦遭判終身監禁 受害者達261人超越「N號房」

#受害者 #Telegram #地方法院 #性剝削 ...



(圖 / 美聯社)



發布時間：2025/11/25 16:12 更新時間：2025/11/25 16:30

許勝嬋 / 綜合報導



002-2 自稱 牧師 強勢誘騙 製作逾千部性犯罪片 N號房3倍規模! 234人受害
.159人未成年 | 記者 許少榛 | 國際關鍵字20251125 | 三立iNEWS

網路交友注意事項

不要留個人
資料

要給含臉的
情感照

不要有金錢
來往

小心令人不
舒服的訊息

要選擇公共
場所見面

不吃來路不
明的東西


不收禮物




003 關於青少年自拍性私密影像-家長該知道的事《協助及支持》
(1080p)



性/性別





決定
權

選擇
權

自主權—選擇權

是指個體擁有選擇的權力與權利，以及選擇的能力。

從積極層面看，是擁有權力與知識了解自己可以有權力選擇，以及可以擁有那些選擇的權益；

從消極層面看，是做選擇的空間不被剝奪。


自主權—決定權

個體自我做決定的權力與權利，以及做決定的自由。

從積極層面看，是擁有做決定的權力與權益；

從消極層面看，是做決定的自由不被干涉。





早期愛滋可怕的影像

深 入 人 心

現在呢？

就是第一千零一個愛滋病患者
the 1001st AIDS victim




004 1分05 周星馳裝艾滋病患者惡搞邱淑貞，超級搞笑
(720p)

難忘的周星馳演出，《整人專家》



A




B



C

@清秋印迹





1



愛滋病最難處理
的問題

污名




愛滋污名

世界上最容易被污名的疾病

Susan Sontag

- 肺結核
- 癌症
- 愛滋病

...much of very reputation of the illness added to suffering of those who had it...contamination, plagues, and punishment





國小愛滋教育

從小紮根，知能表現

基礎課程_第二單元 關「愛」無「礙」

【活動一】

關「愛」趁現在

25分鐘

1-2-1同理與體會愛滋病感染者的
心情。(態度)

1-2-2瞭解關懷愛滋
對愛滋病防治的
意義。(知識)

1-2-3接納與關懷愛
滋病感染者。(態度、
行為意向)

【活動二】

關「愛」齊步走

15分鐘

1-2-3接納與
關懷愛滋病感
染者。(態度、
行為意向)

1-2-4表現關
懷愛滋的行動。
(行為)

【親子共學】

愛滋關懷小卡

1-2-3接納與
關懷愛滋病感
染者。(態度、
行為意向)

1-2-4表現關
懷愛滋的行動。
(行為)



請誠實面對妳/你內心的感受

請舉起你的右手

請誠實面對妳/你內心的感覺…

- 妳/你能接受，如果公眾人物是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果鄰居是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果學生是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果同事是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果朋友是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果親戚是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果兄弟姐妹是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果小孩是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果父母是 **HIV** ？
- 妳/你能接受，如果伴侶是 **HIV** ？



誰是HIV

H I V

感染者



2

學園

H I V

歷史



校園愛滋歷史

真實案例



83年



澎湖縣國小生

91年



大餐入學健康檢查

99年



高醫實習生


3

社會與

H

I

V



這又有多少感染機會？ 污名及歧視？

社會事件



這又有多少感染機會？ 污名及歧視？

社會事件






沒有病毒量就是不會傳染

最新概念

U=U

UNDETECTABLE
=
UNTRANSMITTABLE



A PERSON LIVING WITH HIV
WHO HAS AN UNDETECTABLE
VIRAL LOAD DOES NOT
TRANSMIT THE VIRUS TO THEIR
PARTNERS.

The International AIDS Society is proud to endorse the U=U consensus statement of the Prevention Access Campaign.

4

醫療與

H

I

V



難解的污名問題
由我開始

外界



內化



醫護人員對待愛滋病的態度

只要你救我



愛滋感染者在世界各國的醫療機構當中，都是「醫療人球」的代表性族群。



醫院常常會使用技術性的醫療方式拒絕收治感染者，常用的理由包含了：專業知識不足、缺乏專責醫生等。



愛滋感染與其他疾病共病的病人，在處理共病疾病時更常遭到拒絕。



醫療人員缺乏愛滋感染者的心理照護技巧，在隱私權，各種人權維護上必須更加強。

醫護人員對待愛滋病的態度


只要你救我

Table 6. Assessment of Practices toward Patients with HIV/AIDS

Practice	Number (Percent) ^{a,b}
Have refused to care for a patient with HIV/AIDS (<i>n</i> = 1,017)	
Yes	103 (9)
No	904 (90)
Don't know	10 (1)
Have refused a patient with HIV/AIDS admission to a hospital (<i>n</i> = 1,018)	
Yes	97 (9)
No	911 (90)
Don't know	10 (1)
Have observed others refusing to care for a patient with HIV/AIDS (<i>n</i> = 1,018)	
Yes	657 (66)
No	343 (32)
Don't know	18 (2)
Have observed others refuse a patient with HIV/AIDS admission to a hospital (<i>n</i> = 1,016)	
Yes	413 (43)
No	583 (56)
Don't know	20 (2)
Have verbally mistreated a patient with HIV/AIDS (<i>n</i> = 1,015)	
Yes	6 (.39)
No	1,002 (99)
Don't know	7 (1)


我曾拒絕照顧感染者 9% / 我曾看過同事拒絕照顧感染者 66%

我曾拒絕感染者住院 9% / 我曾看過同事拒絕感染者住院 43%




如果可以選擇，我不會替他們提供醫療服務


使用毒品者



同性戀



性工作者



他們不道德

77.4%

47.4%

63.9%

增加我感染的風險

61.3%

68.4%

73.8%

沒有接受過相關訓練

68.3%

76.3%

67.2%

5

國家政策與

H I V



男男可以捐血 CDC快速澄清

世界上最容易被污名的疾病

阿娘喂！這是什麼政府？台灣到底怎麼了？

看到的好友們！請趕快分享給你的親朋好友們，這是關係到你我的生命問題，A害啦！

https://youtu.be/GdXY_iJw



我國自2013年血品
全面採用NAT檢驗後
未發生因輸血感染愛滋案例

捐血者健康標準
規定目前並未改變

line群組轉傳的捐血害命是舊片
證實是錯的！別再轉傳啦！



衛生福利部
Ministry of Health and Welfare

捐血者健康標準 (95.03.15訂定)

世界上最容易被污名的疾病

關於捐血 你不知道的事

「捐血一袋，救人一命」是人人琅琅上口的一句標語，但你對捐血、血液了解多少呢？



大於45公斤



大於50公斤

至於BMI過重，由於未規定捐血人體重上限，依然可以捐血

你所不知道的捐血禁令

暫緩捐血

- 4周內曾預防接種活性減毒疫苗
- 婦女懷孕中或產後(含流產後)6個月內
- 72小時內拔牙



永不得捐血

- 曾注射胰島素
- 曾吸毒或慢性酒精中毒
- 曾患惡性腫瘤、白血病、出血不止等
- 男性間危險性行為
- 愛滋病患者
- 曾從事性工作

另外，民國69年後曾於歐洲旅遊或居留，合計超過5年者、或民國69年至85年間於英國輸血、或曾至英國旅遊、居留逾3個月也永不得捐血。

第 5 條

捐血者有下列情形之一者，永不得捐血：

- 一、曾患惡性腫瘤、白血病或其他經醫師認為永久不得捐血
- 二、曾有出血不止、抽癢或昏迷之病史者。
- 三、曾有吸毒或慢性酒精中毒者。
- 四、靜脈注射藥物成癮者 **男性間性行為者**及長期使用血液
- 五、曾為 AIDS 患者。
- 六、愛滋病毒第一型及第二型 (HIV-I/HIV-II)、抗體檢查者。
- 七、人類嗜 T、淋巴球病毒第一型 (HTLV-I) 抗體檢查經確
- 八、曾罹患庫賈氏病者 (CJD)、曾注射人類腦下垂體生長荷腦下垂體親生殖腺素 (human pituitary gonadotropins) 等生物製劑者、曾接受硬腦膜移植者或家族中有庫賈氏
- 九、**曾從事性工作者。**

5

女性與

H

I

V



004 Rose wu in un

6


男同志與

H I V B A E

男同志

G

ay



愛的希望 愛的福阿

亞洲第一部感染者與其母親一起入鏡

正面





新聞哇哇哇

後續效應



3/6 新聞挖挖哇：愛之希望(3/6) 20110831



新聞挖挖哇!

JET綜合

病發昏迷五天 現在活得頭好壯壯?

這是我們很想

0:49 / 9:47



7

我們可以做

做

什

麼



**充實自身的性/別知識
學習如何性防護**



保險套知多少



004 買保險套-插頭電視(中文字幕)
004-2 [蔡阿嘎性愛小學堂1] 你保險套戴的正
確嗎- 安全性行為同時也預防愛滋喔!!

保險套知多少



- 取得的管道
- 取得的困難
- 目前台灣販賣保險套的目題
- 如何自在的買保險套
- 到衛保組要
- 其他



用簡單的故事

讓民眾更了解，了解就不怕了

一隻蚊子叮了一個愛滋的人，又叮了一個健康的人

蚊子叮了愛滋的人，停在一個健康的人傷口上

在公園坐到一个針頭，上面留有愛滋的血液



基本觀念

愛滋病毒(HIV)感染其實不可怕，只需要更了解它


愛滋病毒(HIV)傳染途徑有哪些？



不安全性行為



母子垂直感染



血液交換
(如：共用針具、稀釋液等)



透過帶有HIV的體液(血液、精液、陰道分泌物或母乳)，接觸黏膜或破損皮膚而傳染。

愛滋病毒(HIV)感染風險：3個基本條件



必須同時符合以下3個條件，才有可能造成HIV感染。



+

(接觸)



+



HIV一旦離開人體很快就會死亡，
在環境中不易存活。

不同傳染途徑之HIV感染風險



可能增加HIV感染風險，包含：

- ✓ 感染性傳染病 (或生殖器官潰瘍)
- ✓ 處於HIV病毒量高的病程階段
- ✓ 性行為合併使用成癮性藥物(chemsex)

可降低HIV感染風險，包含：


- ✓ 感染者穩定服藥控制體內病毒量，可大幅降低HIV透過性行為傳染給配偶/伴侶之風險。
- ✓ 暴露前/後預防性投藥(PrEP/PEP)
- ✓ 安全性行為(全程正確使用保險套)

不同HIV傳染途徑的風險	每次暴露可能有多少比例可能造成感染?
輸血	92.5%
共用針具	0.63%
針扎	0.23%
肛交(接受方)	1.38%
肛交(進入方)	0.11%
陰道交(女性)	0.08%
陰道交(男性)	0.04%
口交	很低
咬傷	可以忽略的
吐口水	可以忽略的
共用性道具	可以忽略的

為保障輸血安全，透過血品安全控管機制以提升醫療用血品質，並於2013年起全面實施供輸血用血液之核酸擴增檢驗(NAT)，國內迄今無因輸血而感染HIV之個案。



一般日常生活接觸不會傳染愛滋病毒(HIV)



牽握手



擁抱



親吻



一起游泳




共用餐具
一起用餐



共用馬桶



打噴嚏
咳嗽




蚊子叮咬



這些日常生活接觸都**不會傳染HIV**



如何保護自己，預防感染愛滋病毒(HIV)




- ☑ **安全性行為**
全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液，可有效避免感染HIV和其他性傳染病

- ☑ **避免感染風險行為**
如：多重性伴侶、與人共用針頭、針筒或稀釋液等



- ☑ **暴露愛滋病毒「前」預防性投藥 (PrEP)**
經醫師評估，沒有感染HIV且有風險行為者，可透過穩定持續服用PrEP，讓體內有足夠的藥物濃度來預防HIV感染



- ☑ **暴露愛滋病毒「後」預防性投藥(PEP)**
發生感染風險行為後經醫師評估，於暴露後72小時內及早給予預防性藥物，並持續服藥28天，以降低感染風險



- ☑ **定期接受HIV檢驗 (HIV初步檢驗+確認檢驗)**
瞭解自己的健康狀態，及早診斷，及時銜接治療或轉介預防服務(如：PrEP)

事前預防

Pre-exposure prophylaxis

PrEP

暴露HIV「前」預防性投藥

藥物含TDF抗HIV成分(至多2種)

疾管署網頁
HIV預防性投藥



事後緊急使用

Post-exposure prophylaxis

PEP

暴露HIV「後」預防性投藥

藥物含3種抗HIV成分

- 日常預防用：針對HIV檢驗陰性且持續有感染高風險行為者(如：感染者配偶/伴侶、年輕族群等)
- 使用方法：經醫師評估，每日服用1顆 或 視需求服用(事件發生前24小時2顆與發生後24小時及48小時各1顆)。
- 藥物費用(自費部分)：約10,350-12,420元/月
- 藥物副作用較少

- 緊急狀況使用，有時效性
於發生感染風險行為後**72小時內**儘早請醫師評估，給予預防性藥物，**需持續服藥28天**
- 使用方法：經醫師評估，每日1~8顆，分1~2次服用(視藥物種類)，完整全程服藥28天。
- 藥物費用(自費部分)：約15,000-25,000元/月
- 藥物副作用可能較多，因人而異

疾管署HIV預防性投藥資訊：<https://>

9

g


TAIWAN CDC




疫情概況與95-95-95

愛滋疫情逐年下降，朝消除愛滋目標努力!

HIV/AIDS統計月報表
本國籍感染人類免疫缺乏病毒者趨勢圖
1984年至2022年11月(依診斷日分析)




感染HIV危險因子超過9成為不安全性行為



資料更新至2022/2/1

HIV感染者以年輕族群為多，影響國家競爭力


以15-34歲年輕族群為主



資料更新至2022/2/1

2021年本國籍新確診通報HIV個案篩檢問卷分析

個案於本次通報就醫前，無HIV篩檢經驗者自述之前未曾篩檢原因(n = 481人，複選題)



資料來源：醫院個管初收問卷、愛滋追管系統疫調資料，問卷資料截至2022/2/24

對愛滋的偏見及歧視

高風險者不願篩檢，感染者不敢治療

偏見

誤解

恐懼


歧視



自2008年「人類免疫缺乏病毒感染者權益保障辦法」施行迄今，已協助近百件個案之申訴/陳情案；類別以「隱私」、「就業」及「就醫」權益受損為最多

手機交友APP助長疫情

鮑整APP鸚恂隶隱毳髻靚廡靛涸 倥 盤
 麥 (柯 乃榮 ,20



使用手機上網的比率顯著上升

下載APP類型主要以**社交類**為主
(69.8%)

(台灣無線網路使用狀況調查報告,2016)




劑:欽鮑整, APP涸④

蟹#踏標泐菘靚泐涸嫵::

僣尝:欽涸2>


(Lehmiller J J et al,2014)



藥愛(Chemsex)科學實證

世界衛生組織(WHO) 成癮藥物使用者之愛滋預防、治療與照護指引


- 同性與異性間性行為均可能發生藥愛(Chemsex)行為。
- 藥愛防治需考量不同族群特性及需求，才能達最大效益。



資料來源：UNODC(2019) · HIV Prevention, Treatment, Care and Support for People Who use Stimulant Drugs Technical Guide

成功大學
李佳雯醫師研究(2021)


- 台灣藥愛常見藥物，以**甲基安非他命(占87.8%)**為大宗。
- 甲基安非他命**可增加性慾、增加活力、增強感官知覺，成為部分**性愛時之助性劑**。



資料來源：李佳雯(2021) · International Journal of Drug Policy

台北市立聯合醫院 陳亮妤醫師研究(2021)

透過「手機約砲」發生性行為且同時使用「非法藥物」，與「愛滋及其他性傳染病」感染達顯著相關。



資料來源：陳亮妤(2021) · Drug and Alcohol Review

聯合國愛滋規劃署(UNAIDS) 2030年95-95-95目標

95% 95% 95%

感染者知道
自己感染

已知感染者
有服藥治療

服藥之感染者
病毒量測不到



血液中已測不到愛滋病毒量，
健康狀態與一般人無異，大幅
降低傳染風險。

台灣

2021

90% 94% 95%

台灣

2020

90% 93% 95%

全球

2020

84% 87% 90%

台灣3個95
均**優於**全球平均



資料來源：Fact sheet - Latest global and regional statistics on the status of the AIDS epidemic.

TAIWAN CDC

<https://>

[s.](#)

呼應UNAIDS提出2030年消除愛滋目標

Targets for ending the AIDS epidemic

by 2020

90-90-90

Treatment

500 000

New infections among adults

ZERO

Discrimination

by 2030

95-95-95

Treatment

200 000

New infections among adults

ZERO

Discrimination



HIV 的傳染途徑



不安全
性行為




血液



母子垂直感染

認識 HIV & AIDS

基本小常識



HIV

- ✿ 人類免疫缺乏病毒 (愛滋病毒)
- ✿ HIV感染者
- ✿ 未發病



AIDS

- ✿ 後天免疫缺乏症候群
- ✿ 愛滋病患者
- ✿ 發病
- ✿ CD4低於200+伺機性感染



匿名篩檢

基本小常識

愛滋病已是一個慢性病

台灣愛滋病學會理事長林錫勳醫師強調，
愛滋病防治需多管齊下，除了行為的預防，
早期全面服用抗病毒藥物，
已證實是達到「零感染」的重要策略。

聯合國衛生組織（WHO）也調整抗病毒藥物治療
時機，將 CD4 細胞從 350 提升到小於 500 以下即開
始治療，除可降低感染者罹病率，更可避免將病毒
傳染給其他人。（2013/07/06 中華日報）

匿名篩檢

基本小常識

+ 篩檢方法

- + 抽血匿名篩檢
- + 試劑快速篩檢
- + 唾液快速篩檢

+ 結果所需時間

- + 約1星期
- + 15~20分
- + 15~20分

+ 費用

- + 免費
- + 免費
- + 650元



免費

預防性投藥

最新發明

前

PrEP

暴露愛滋病毒前
預防性投藥

持續有高風險行為者



每日一顆
或依需求使用

副作用少

按時服藥保護力
達90%以上

PEP

後

暴露愛滋病毒後
預防性投藥

發生疑似暴露
愛滋風險行為者

暴露後72小時內
儘早投藥並持續28天

副作用可能較多些

一般估計至少
80%以上

預防性投藥無法預防其他性病，應搭配安全性行為
(正確使用保險套及水性潤滑液)等預防措施
才能最有效預防愛滋及其他性傳染病




沒有病毒量就是不會傳染

最新概念

U=U

**UNDETECTABLE
=
UNTRANSMITTABLE**



A PERSON LIVING WITH HIV
WHO HAS AN UNDETECTABLE
VIRAL LOAD DOES NOT
TRANSMIT THE VIRUS TO THEIR
PARTNERS.

The International AIDS Society is proud to endorse the U=U consensus statement of the Prevention Access Campaign.

平等



EQUALITY

公平



EQUITY

正義



LIBERATION



社團法人台灣愛之希望協會

陽光酷兒中心 07-2351010